

# 症例相談事例 インテークシート

(作成日: 年 月 日)

相談対象者の氏名 (イニシャル)	(男・女)	生年月日	
入院に至る経緯(現病歴)		服薬情報	
栄養方法		経口摂取:有・無 主菜( ) 副菜( ) 水分:トロミなし・トロミ付き・ゼリー・ 代替栄養:PPN(末梢静脈栄養)TPN(中心静脈栄養)EN(経口法 経管栄養法) PEG	
<b>嚥下機能・全身状態の評価</b>			
<b>1.認知</b>		<b>6.発声・構音(気切: 無・有 [カフ: 無・有])</b>	
意識	清明・不清明・傾眠	発声	有声・無声・なし
意思表示	良・不確実・不良	湿性嚙声	なし・軽度・重度
従命	良・不確実・不良	構音障害	なし・軽度・重度
食への意欲	あり・なし・不明	開鼻声	なし・軽度・重度
その他:		その他:	
<b>2.食事</b>		<b>7.呼吸機能</b>	
摂取姿勢	椅子・車椅子・端座位・bedup( )°	呼吸数	回/分
摂取方法	自立・見守り・部分介助・全介助	随意的な咳	十分・不十分・不可
飲食中のムセ	なし・まれ・頻回	MPT(sec)	
口腔内食物残留	なし・少量・多量	SpO2(%)	
流涎	なし・少量・多量	<b>8.スクリーニングテスト</b>	
その他:		改訂水飲みテスト(3ml, ml) 1. 嚥下なし, むせる and/or 呼吸切迫 2. 嚥下あり, 呼吸切迫 (silent aspirationの疑い) 3. 嚥下あり, 呼吸良好, むせる and/or 湿性嚙声 4. 嚥下あり, 呼吸良好, むせなし 5. 4.に加え,追加空嚥下運動が30秒以内に2回可能	
<b>3.頸部</b>		フードテスト(ヨーグルト、プリン等 4g) 1. 嚥下なし, ムセありand/or呼吸切迫 2. 嚥下あり, 呼吸切迫(silent aspiration の疑い) 3. 嚥下あり, 呼吸良好, むせるand/or湿性嚙声and/or口腔内残留中等度 4. 嚥下あり, 呼吸良好, むせない, double swallowで嚥下 5. 嚥下あり, 呼吸良好, ムせない, single swallowで嚥下	
頸部可動域	制限なし・少し動く・不動		
その他:		<b>その他</b>	
<b>4.口腔</b>			
義歯(不要・要)	適合・不良・なし	<b>9.対象者の身体状態</b>	
衛生状態(口腔)	良好・不十分・不良		
口腔乾燥	なし・軽度・重度		
舌苔付着	なし・軽度・重度		
<b>5.口腔咽頭機能</b>		①寝たきり度(J A <sub>1</sub> A <sub>2</sub> B <sub>1</sub> B <sub>2</sub> C <sub>1</sub> C <sub>2</sub> ) ②麻痺(なし 左上肢 右上肢 左下肢 右下肢) ③起居・移動(自立 一部介助 全介助 端座位) ④歩行(自立 杖歩行 歩行器 車椅子) ⑤障害 聴覚(程度 ) 視力(程度 ) ⑥座位耐久性(十分・不十分・不可)	
口唇閉鎖	不可 不良 正常 (障害側:右・左)		
舌運動 挺舌	不可 不良 正常 (障害側:右・左)		
oral diadocokinesis	/pa/ 回/sec /ta/ 回/sec /ka/ 回/sec 4.0回/秒以上(健常値)		
軟口蓋挙上	不可 不良 正常 (障害側:右・左)		
gag reflex	なし 弱い あり<右>なし 弱い あり<右>		